

प्याजी डडुवा

(purple blotch/alternaria blight) (*Alternaria porri*)

प्याजको डडुवा (Purple Blotch/Alternaria Blight) दुसीजन्य रोग हो, जसले पातमा बैजनी-खैरो दागहरू देखाई बोट सुकाउँछ । यो रोग पानीका छिटा र हावाबाट सर्छ । नियन्त्रणका लागि स्वस्थ बीउ प्रयोग गर्ने, खेत सफा राख्ने, र लक्षण देखिनासाथ डाइमथेमर्फ वा म्यानकोजेब जस्ता दुसीनाशक औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ ।



लक्षणहरू

यो रोगले बिरुवाको सबै भागहरूमा आक्रमण गर्न सक्दछ । सुरुसुरुमा यसको लक्षण पातहरूमा देखा पर्दछ । सानो सेतो लाम्बो थोप्लाहरू नरम पातहरूमा देखिन्छन् । पातको टुप्पोमा सबभन्दा पहिलो यो लक्षण देखा पर्दछ । विस्तारै यी थोप्लाहरू पातदेखि तलतिरका भागहरूमा पनि फैलिँदै जान्छन् । यी थोप्लाहरू मिसिएर तुला धब्बाहरू बन्दछन् । रोग छिप्पिँदै जाँदा पात र डाँठहरू घुमाउरो परेका देखिन्छन् । पछि पातहरू जम्मै डढेर सकिन्छन् । गानोमा पनि रोग फैलिँदै जान्छ । गानोमा चारैतिर रातो पहुँलो पानी निस्कन्छ र सड्न थाल्दछ । रोगी बोटहरूमा फुल फल्दैन ।

रोगको श्रोत र रोग फैलिने वातावरण

रोगी बीउ तथा संक्रमित पुराना बोटका अवशेषहरू रोगका श्रोतहरू हुन् । बारम्बार पानी परेमा र तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियस कायम रहेमा रोगले उग्रता लिन्छ । दुसीलाई पानीका छिटा तथा हावाले एक बिरुवा बाट अर्कोमा वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलाउँछ ।

त्यवस्थापन

- पुर्वतयारी: रोगी बोट र भारपातहरू नष्ट गर्ने र बाक्लो रोपनबाट जोगिने ।
- २-३ वर्ष सम्मको घुम्ती बाली प्रणाली अपनाउने ।
- बाली चक्रमा गानो बालीको सट्टा अन्नबाली ,कोसेबाली वा काउली बालीहरू लगाउने ।
- पुराना घाँसपातका टुटाहरू, भारपातहरू बटुलेर जलाउने ।
- रोग लागेका प्याजका गानाहरू भण्डारण नगर्ने ।
- पछौटे बालीमा यो रोग बढी लाग्ने भएकाले रोग छल्नको लागि बाली छिटो लगाउने ।
- थाइरम विषादी २ ग्राम प्रति किलो बिउका दरले मिसाएर बिउ उपचार गर्ने ।
- रसायनिक नियन्त्रण: रोग लागेको ठाउँमा डाइमथेमर्फ (Dimethomorph) प्रति लिटर पानीमा १-१.५ ग्राम वा म्यानकोजेब (Mancozeb) प्रति लिटर पानीमा २ ग्राम मिसाएर १०-१२ दिनको फरकमा २-३ पटक छर्ने ।



प्रकाशक

लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

बाली संरक्षण प्रयोगशाला, खजुरा, बाँके